

がん種（適応）	大腸癌		
開始年月日	年 月 日	1 コース期間	14 日間
体格	身長 &tagPatHeight& cm	体重 &tagPatWeight& kg	体表面積 m ²
嘔気・嘔吐リスク	中等度	制吐剤	パロノセトロン注 +デキサート注 6.6mg
特記事項 (オキサリプラチン)	BRAF 変異陽性大腸癌の 1 次治療レジメンです オキサリプラチンは 6 コース目以降アレルギー症状に注意が必要です。アレルギー予防に前処置としてデキサート注 16.5 mg、ファモチジン注 20 mg、レスタミン錠 50 mg で効果があったという報告があります		

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール
ビラフトビ	<u>1 回</u> 300mg 1 日 1 回	経口	連日服用
アービタックス	mg (500mg/m ²)	2 時間	Day1
オキサリプラチン	mg (85mg/m ²)	2 時間	Day1
レボホリナート	mg (200mg/m ²)	2 時間	Day1
5-FU (急速静注)	mg (400mg/m ²)	15 分	Day1
5-FU (持続静注)	mg (2400mg/m ²)	46 時間	Day1

ビラフトビ (75) 4C1×
 レスタミン錠 (10) 5錠 アービタックス 30 分前
 ミノマイシン (100) 2C2×朝夕食後
 ヘパリン類似物質油性クリーム 全身
 ベタメタゾン酪酸エステル軟膏 (アンテベート GE) 体
 ロコイド軟膏 顔

□HBs 抗原(-) → □HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-) → □HBV-DNA 定量(-) → 3ヵ月毎 定量
□HBs 抗体(+)and/or HBc 抗体(+) → □HBV-DNA 定量(+) → **消化器内科紹介**

指示医師サイン