光晴会病院化学療法委員会
2025 年 4 月 10 日

フリュザクラ　療法

患者番号:　　氏名:　　性別：　　年齢:

がん種（適応）	大腸癌		
開始年月日	年　　月　　日		
1 コース期間	21　日間		
体格	身長 &tagPatHeight& cm　体重 &tagPatWeight& kg　体表面積　㎡		
嘔気・嘔吐リスク	内服：軽度	制吐剤	なし
特記事項	甲状腺機能を開始時に測定ください		

投与薬剤	投与量	投与スケジュール
フリュザクラ	5　mg	3 週服用　1 週休薬

減量レベル	投与量	副作用発現時の減量中止基準
1 段階減量	4mg/回	副作用により中止、減量、再開の基準は違うので添付文書等を確認し対応を行う。
2 段階減量	3mg/回	
中止	3mg/回で忍容性が得られない場合、投与を中止する	

【処方が必要な内服薬】

ピドキサール（10）　6 錠　3×毎食後
尿素クリーム 10%　1 日 5 回以上塗布

□HBs 抗原(＋) → 消化器内科紹介
□HBs 抗原(－) → □HBs 抗体(－)and HBc 抗体(－)
□HBs 抗体(＋)and/or HBc 抗体(＋) → □HBV-DNA 定量(－) → 3 ヵ月毎 定量
□HBV-DNA 定量(＋) → 消化器内科紹介

指示医師サイン＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿