

ノギテカン療法

患者番号:

氏名:

性別:

年齢:

がん種 (適応)	小細胞肺癌		
開始年月日	年	月	日
1 コース期間	3 週間		
体格	身長 &tagPatHeight& cm	体重 &tagPatWeight& kg	体表面積 m ²
嘔気・嘔吐リスク	軽度	制吐剤	パロノセトロン注
特記事項			

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール
ハイカムチン	mg (1.0mg/m ²)	30 分	5 日間投与して 最低 16 日は休薬

※腎障害 (CCr20-39mL/min) のある患者では半量 (0.5 mg/m²) で開始

増減量の段階	投与量	投与後の最低値が白血球 2000 以上及び血小板 5 万以上の場合には増量できる。 白血球 1000 未満又は血小板 3 万未満となった場合には減量する。
1 段階増量	1.2 mg/m ² /日	
初回投与量	1.0 mg/m ² /日	
1 段階減量	0.8 mg/m ² /日	

【処方が必要な内服薬】

☐HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介

☐HBs 抗原(-) → ☐HBs 抗体(-)and HBc 抗体(-)

☐HBs 抗体(+)and/or HBc 抗体(+)

☐HBV-DNA 定量(-) → 3 ヶ月毎 定量

☐HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン