

リムパーザ療法

患者番号: 氏名: 性別: 年齢:

がん種（適応）	膵臓癌		
開始年月日	年	月	日
1 コース期間	連日		
体格	身長 &tagPatHeight& cm	体重 &tagPatWeight& kg	体表面積 m ²
嘔気・嘔吐リスク	中等度	制吐剤	
特記事項	プラチナ薬による治療で 16 週以上効果が維持されている BRCA 変異陽性患者が対象の目安となるが早めでも可能 投与中および最終投与後一定期間は避妊が必要です (男: 3 ヶ月 女: 6 ヶ月)		

投与薬剤	投与量	投与時間	投与スケジュール
リムパーザ	1 回 300mg 1 日 2 回 朝夕食後(約 12 時間毎)	経口	連日服用

<用量調節>

腎機能 CCr30-50mL/min・・・1 回 200mg 1 日 2 回
CCr30 未満・・・投与しない

相互作用 強い CYP3A 阻害剤（イトラコザール リトナビル ホリコザール等）
・・・1 回 100mg 1 日 2 回

中程度の CYP3A 阻害剤（シプロフロキサシン ジルチアゼム エリスロマイシン ベラパミル
フルコザール等）
・・・1 回 150mg 1 日 2 回

【処方が必要な内服薬】

リムパーザ 1 日 2 回 朝夕食後(食事の時間が特殊な場合は 12 時間ごとになるよう調整)
(処方推奨)
ドンペリドン 吐き気時
ロペミン 下痢時

☐ HBs 抗原(+) → 消化器内科紹介

☐ HBs 抗原(-) → ☐ HBs 抗体(-) and HBc 抗体(-)

☐ HBs 抗体(+) and/or HBc 抗体(+)

☐ HBV-DNA 定量(-) → 3 ヶ月毎 定量

☐ HBV-DNA 定量(+) → 消化器内科紹介

指示医師サイン